

MPHW-FHW MOST IMP GK

રાષ્ટ્રીય રસીકરણ કાર્યક્રમ

(એ)

ઉંમર	રસીનું નામ	ડોઝ	રૂટ
૦-૧ વર્ષ નવજાત શીશુ	હોસ્પિટલમાં જન્મ સમયે - BCG OPV-0 Dose	૦.૦૫ML.	Intradermal ચામડીની અંદર મોં ધ્વારા બે ટીપા
૧/૧-૨ માસ	૧. BCG	૦.૧ ML.	Intradermal ચામડીની અંદર
	૨. DPT - ત્રીગુણી - પ્રથમ ડોઝ	૦.૫ ML.	Intramuscular સ્નાયુની અંદર
	૩. OPV પ્રથમ ડોઝ પોલીઓ વિરોધી રસી	-	બે ટીપા મોં ધ્વારા
	૪. Hepatitis B પ્રથમ ડોઝ બી પ્રકારના કમળા વિરોધી	૦.૫ ML.	Intramuscular સ્નાયુની અંદર
૨/૧-૨ માસ	ત્રિગુણી - બીજો ડોઝ	,,	ઉપર મુજબ
	પોલીઓ વિરોધી બીજો ડોઝ રસી	,,	ઉપર મુજબ
	બી-પ્રકારના કમળા - બીજો વિરોધી રસી	,,	ઉપર મુજબ
૩/૧-૨ માસ	ત્રિગુણી - ત્રીજો ડોઝ	,,	ઉપર મુજબ
	OPV-3 Hepatitis - 3	,,	
૯ થી ૧૨ માસ	ઓરી વિરોધી રસી	૦.૫ ML.	Subcutaneous ચામડીની નીચે
(બી)			
૧૬ થી ૨૪ માસનું યાવ ત્યારે	ત્રિગુણી	બુસ્ટર ડોઝ	ઉપર મુજબ
	પોલીઓ - OPV	,,	,,
(સી)			
૫ થી ૬ વર્ષ	DT ડીપ્થેરીઆ અને ટીટેનસ દ્વિગુણી	૦.૫ ML.	Intramuscular
(ડી)			
૧૦ થી ૧૬ વર્ષ બાળક	TT (ટીટેનસ ટોક્સોઈડ)	૦.૫ ML.	
(ઈ)			
વહેલામાં વહેલી તકે	સગર્ભા માતા TT-1 TT ટીટેનસ ટોક્સોઈડ - પ્રથમ ડોઝ	૦.૫ ML.	Intramuscular
	બીજો ડોઝ - ૧ માસ બાદ - TT-2/બુસ્ટર	,,	ઉપર મુજબ

અમારી તમામ અપડેટ તમારા મોબાઇલ પર મેળવવા માટે what Sapp no 7622041484/9662543643 પર MPHW/FHW લખી મોકલો.

નોંધ :

વેકસીન યોગ્ય ઉષ્ણતામાને જાળવવા માટેના ફોલ્ડ ચેઈનના સાધનો

1. Walk in Cold Rooms – ૩ માસ સુધી વેકસીન જાળવી શકાય.
2. Deep Freezers, Ice-lined - જિલ્લા કક્ષાએ – Ice-Packs બનાવવા અને OPV and measles વેકસીન જાળવવા
3. Cold Boxes, Vaccine Carrier, Day Carrier - DPT, DT, TT વેકસીન, ડાઈલ્યુઅન્ટ જાળવવા, વેકસીન Ice Packs ના સીધા સંપર્કમાં રાખવા નહિ. પ્લાસ્ટીક થેલીમાં વેકસીન રાખવા.

Immunisation – Side Effects Hazards

Local Reactions :

Pain, Tenderners
Swelling
Redness
Nodule
Sterile Abscess

General Reactions :

Fever

Provocative Poliomyelitis :

DPT આપ્યા બાદ

Encephalitis :

Prevention :

1. Sensitivity test

- TT આપતી વખતે
- Antisera ATS/
- Antitoxin A.D.S./

2. Anaphylactic

- Shock માં સારવાર માટે
- Inj. Adrenaline
- Inj. Dexona
- Inj. Avil તૈયાર રાખવા